

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間(週)	催吐リスク	適応分類	癌種
695	5-FU + MMC + RT	5-FU マイトマイシン	フルオロウラシル マイトマイシンC	1000 10	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	24時間 全開	day1-4 day1	点滴静注 点滴静注	4	軽度 軽度	進行・再 発 放射 線化学療	肛門癌
778	Eribulin	ハラヴェン	エリ布林メシル酸塩	1.4	mg/m <sup>2</sup>	2-5分	day1,8	点滴静注	3	軽度	進行・再	悪性軟部腫瘍
831	Pembrolizumab(q3W)	キイトルーダ	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注	3	最小度	進行・再	MSI-High固形癌
899	Pembrolizumab(q6W)	キイトルーダ	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	400	mg/body	30分	day1	点滴静注	6	最小度	進行・再	MSI-High固形癌
964	ADR	アドリアシン	ドキシソルビシン塩酸塩	60	mg/m <sup>2</sup>	15分	day1	点滴静注	3	中等度	進行・再	悪性軟部腫瘍
890	CDDP + VP-16	ラステット シスプラチン	エトポシド シスプラチン	100 80	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	2時間 1時間	day1-3 day1	点滴静注 点滴静注	3	最小度 高度	進行・再	神経内分泌腫瘍