

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク	適応分類
302	TMZ初発 (75) 1クール+RT	テモダール	テモゾロミド	75	mg/m ²	90分	day1-42	点滴静注	10	中等度	放射線化学療法
303	TMZ初発 (150) 2クール以降	テモダール	テモゾロミド	150	mg/m ²	90分	day1-5	点滴静注	4	中等度	放射線化学療法
304	TMZ初発 (200) 3クール以降増量可	テモダール	テモゾロミド	200	mg/m ²	90分	day1-5	点滴静注	4	中等度	放射線化学療法
305	TMZ再発 (150) 1クール以降	テモダール	テモゾロミド	150	mg/m ²	90分	day1-5	点滴静注	4	中等度	進行・再発
306	TMZ再発 (200) 2クール目以降増量可	テモダール	テモゾロミド	200	mg/m ²	90分	day1-5	点滴静注	4	中等度	進行・再発
716	BV(10/q2w/脳)	アバスチン	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	10	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注	2	最小度	進行・再発
741	BV(15/q3w/脳)	アバスチン	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	15	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注	3	最小度	進行・再発 その他
742	TMZ+BV 【初発/TMZ:75/RT】 (TMZ:po)	テモダール アバスチン	テモゾロミド ベバシズマブ (遺伝子組換え)	75 10	mg/m ² mg/kg	 30-90分	day1-42 day1,15,29,43	経口 点滴静注	10	中等度 最小度	放射線化学療法
743	TMZ+BV 【初発maintenance/TMZ:150-200】 (TMZ:po)	テモダール アバスチン	テモゾロミド ベバシズマブ (遺伝子組換え)	150-200 10	mg/m ² mg/kg	 30-90分	day1-5 day1,15	経口 点滴静注	4	中等度 最小度	その他
782	TMZ+BV 【初発/TMZ:75/RT】 (TMZ:div)	テモダール アバスチン	テモゾロミド ベバシズマブ (遺伝子組換え)	75 10	mg/m ² mg/kg	90分 30-90分	day1-42 day1,15,29,43	点滴静注 点滴静注	10	中等度 最小度	放射線化学療法
895	CARE	ラステット カルボプラチン	エトポシド カルボプラチン	150 450	mg/m ² mg/m ²	3時間 2時間	day1-3 day1	点滴静注 点滴静注	4	最小度 中等度	術後
896	ICE(脳)	シスプラチン イホマイド ラステット ウロミテキサン	シスプラチン イホスファミド エトポシド メスナ	20 900 60 180×3	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	24時間 2時間 2時間 15分×3	day1-5 day1-5 day1-5 day1-5	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	4	高度 中等度 最小度 最小度	術後