

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク	適応分類
463	CBDCA + 5-FU + Cmab	カルボプラチン 5-FU アービタックス	カルボプラチン フルオロウラシル セツキシマブ (遺伝子組換え)	5 800 250 (導入時の day1のみ400)	AUC mg/m ² mg/m ²	2時間 24時間 250:1時間 400:2時間	day1 day1-5 day1,8,15	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	中等度 軽度 最小度	進行・再発
673	CBDCA + 5-FU + RT	カルボプラチン 5-FU	カルボプラチン フルオロウラシル	1.5 400	AUC mg/m ²	2時間 24時間	day1-4 day1-5	点滴静注 点滴静注	3	中等度 軽度	進行・再発 放射線化学療法
460	CBDCA + RT	カルボプラチン	カルボプラチン	1.5	AUC	30分	day1	点滴静注	1	中等度	術後 放射線化学療法 進行・再発
459	CDDP (分割) +RT	シスプラチン	シスプラチン	20	mg/m ²	2時間	day1-4	点滴静注	3	高度	術後 放射線化学療法 進行・再発
458	CDDP+RT	シスプラチン	シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注	3	高度	術後 放射線化学療法 進行・再発
464	Cmab (maintenance)	アービタックス	セツキシマブ (遺伝子組換え)	250	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注	1	最小度	進行・再発
461	Cmab + RT	アービタックス	セツキシマブ (遺伝子組換え)	250 (導入時の day1のみ400)	mg/m ²	250:1時間 400:2時間	day1	点滴静注	1	最小度	進行・再発
703	DTX(tri-weekly/頭頸部)	ドセタキセル	ドセタキセル	60	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注	3	軽度	進行・再発
289	DTX (weekly/頭頸部)	ドセタキセル	ドセタキセル水和物	20	mg/m ²	4時間	day1	点滴静注	1	軽度	進行・再発
286	FP	シスプラチン 5-FU	シスプラチン フルオロウラシル	80 800	mg/m ² mg/m ²	2時間 24時間	day1 day1-5	点滴静注 点滴静注	4-5	高度 軽度	進行・再発
462	FP + Cmab	シスプラチン 5-FU アービタックス	シスプラチン フルオロウラシル セツキシマブ (遺伝子組換え)	80 800 250 (導入時の day1のみ400)	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	2時間 24時間 250:1時間 400:2時間	day1 day1-5 day1,8,15	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	高度 軽度 最小度	進行・再発
948	FP+Pembrolizumab	シスプラチン 5-FU キイトルーダ	シスプラチン フルオロウラシル ペムブロリズマブ (遺伝子組換え)	80 1000 200	mg/m ² mg/m ² mg/body	2時間 24時間 30分	day1 day1-4 day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	高度 軽度 最小度	進行・再発
295	FP + RT	シスプラチン 5-FU	シスプラチン フルオロウラシル	80 400	mg/m ² mg/m ²	2時間 24時間	day1 day1-5	点滴静注 点滴静注	4-5	高度 軽度	放射線化学療法 進行・再発
949	IC-PCE	カルボプラチン パクリタキセル	カルボプラチン パクリタキセル	1.5 80	AUC mg/m ²	1時間 1時間	day1 day1	点滴静注 点滴静注	1	中等度 軽度	術前 進行・再発

		アービタックス	セツキシマブ (遺伝子組換え)	250 (導入時の day1のみ400)	mg/m ²	250:1時間 400:2時間	day1	点滴静注		最小度	
836	Nivolumab(q2W/頭頸部)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	240	mg/body	30分	day1	点滴静注	2	最小度	進行・再発
913	Nivolumab(q 4 W/頭頸部)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	480	mg/body	30分	day1	点滴静注	4	最小度	進行・再発
675	OK-432 (頭頸部)	ピシバニール	溶連菌抽出物	5	KE/body	one shot	day1	腫瘍内・ 腫瘍辺縁 注入皮下 注		最小度	その他
916	PCE	パクリタキセル カルボプラチン アービタックス	パクリタキセル カルボプラチン セツキシマブ (遺伝子組換え)	100 2.5 250 (導入時の day1のみ400)	mg/m ² AUC mg/m ²	1時間 1時間 250:1時間 400:2時間	day1.8 day1.8 day1,8,15	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	軽度 中等度 最小度	進行・再発
918	Pembrolizumab(q 3W/頭頸部)	キイトルーダ	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注	3	最小度	進行・再発
944	Pembrolizumab(q 6W/頭頸部)	キイトルーダ	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	400	mg/body	30分	day1	点滴静注	6	最小度	進行・再発
862	PTX (weekly/頭頸部)	パクリタキセル	パクリタキセル	100	mg/m ²	60分	day1,8,15	点滴静注	4	軽度	進行・再発
686	PTX + Cmab	パクリタキセル アービタックス	パクリタキセル セツキシマブ (遺伝子組換え)	80 250 (導入時の day1のみ400)	mg/m ² mg/m ²	1時間 250:1時間 400:2時間	day1,8,15 day1,8,15,22	点滴静注 点滴静注	4	軽度 最小度	進行・再発
287	TPF	ドセタキセル シスプラチン 5-F U	ドセタキセル水和物 シスプラチン フルオロウラシル	70 70 750	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1時間 2時間 24時間	day1 day1 day1-5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	軽度 高度 軽度	術前 進行・再発
288	TPF + RT	ドセタキセル シスプラチン 5-F U	ドセタキセル水和物 シスプラチン フルオロウラシル	50 60 600	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1時間 2時間 24時間	day1 day1 day1-5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3	軽度 高度 軽度	術前 放射線化学療法 進行・再発
294	選択的動注化学療法 (CF)	シスプラチン 5-F U	シスプラチン フルオロウラシル	100 800	mg/m ² mg/m ²	30分 24時間	day1 day1-5	動注 点滴静注	3	高度 軽度	術前 進行・再発