

クリニカルパスウェイ 気管支鏡検査を受ける患者さんへ

平成30年2月作成
慈恵医大第三病院

令和6年2月 改訂

	入院日(検査前日)	検査日(検査前)	検査中	検査後	退院日	退院後の生活
日時	月 日		月 日		月 日	月 日
目標	<input type="checkbox"/> 安心して検査に望むことができる		<input type="checkbox"/> 苦痛なく検査が行える	<input type="checkbox"/> 合併症の出現に注意し早期に対応することができる	<input type="checkbox"/> 合併症なく安全・安楽に退院できる	<input type="checkbox"/> 呼吸状態が悪化なく日常生活を送ることができる
食事	<input type="checkbox"/> 食事は夕食までとなります <input type="checkbox"/> 水分は検査前日の23時までです	<input type="checkbox"/> 朝食と水分は禁止です。		<input type="checkbox"/> 検査後2時間は禁飲食となります <input type="checkbox"/> 看護師と水飲みテストを行い、問題がなければ、飲水・食事開始となります		<input type="checkbox"/> 制限はありません
活動		<input type="checkbox"/> 検査前に時計・義歯・眼鏡(コンタクトレンズ)・貴金属類を外して下さい <input type="checkbox"/> 排尿を済ませ独歩・車椅子で検査室(1階放射線部)に向かいます	<input type="checkbox"/> 検査中は発声できないため、合図を決めます。仰向けの体位で検査を行います	<input type="checkbox"/> ストレッチャーで帰室します		<input type="checkbox"/> 制限はありません
検査処置		午後より点滴を開始します			<input type="checkbox"/> 朝レントゲンを行います <input type="checkbox"/> 医師の確認後、退院が決まります	
薬	<input type="checkbox"/> 抗凝固・抗血小板薬は中止のままです <input type="checkbox"/> 常用薬は普段通りに内服してください	<input type="checkbox"/> 朝食後の常用薬については医師から指示があります <input type="checkbox"/> 検査直前にコデインリン酸塩錠(鎮咳薬)を内服します <input type="checkbox"/> 抗凝固・抗血小板薬は中止のままです		<input type="checkbox"/> 苦痛を和らげる薬剤を点滴します <input type="checkbox"/> 検査終了後しばらくの間は薬が効果により眠気が残る場合があります。トイレなどベッドから離れる際は必ずナースコールで看護師にお知らせ下さい	<input type="checkbox"/> 抗凝固薬・抗血小板薬の再開は医師の指示があります	
清潔						<input type="checkbox"/> 制限はありません。
指導説明				<input type="checkbox"/> 検査終了後、血痰があった場合はすぐに看護師までお知らせください <input type="checkbox"/> 痛みや苦しさがある場合は我慢しないで看護師にお知らせ下さい	<input type="checkbox"/> 退院の際に、次回外来の予約票をお渡します <input type="checkbox"/> 他院を受診される方は退院日に紹介状をお渡します	<input type="checkbox"/> 次のような症状が出たら受診をお願いします(出血・咳の増強・発熱・痛み) ※なお、来院される前に、内科外来に電話でご相談ください