

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
外科	16-24-025	SOX+アバステン	21	続けられるまで	オキサリプラチン ペバシズマブ S1	点滴静注 点滴静注 内服	130 mg /m2 7.5 mg /kg 120 mg /b	2hr ※ 分2	d1 d1 d1(夕)-d15(朝)	※①90min②60min③30min 80-120mg/b
外科	16-24-026	XELOX+アバステン	21	続けられるまで	オキサリプラチン ペバシズマブ カベシタピン	点滴静注 点滴静注 内服	130 mg /m2 7.5 mg /kg 2000 mg /b	2hr ※ 分2	d1 d1 d1(夕)-d15(朝)	※①90min②60min③30min
外科	16-24-028	XELOX	21	続けられるまで	オキサリプラチン カベシタピン	点滴静注 内服	130 mg /m2 2000 mg /b	2hr 分2	d1 d1(夕)-d15(朝)	
外科	16-24-037	アービタックス+mFOLFOX6療法(biweekly)	14	規定なし	セツキシマブ セツキシマブ セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	400 mg /m2 250 mg /m2 250 mg /m2 85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 1200 mg /m2	2hr 1hr 1hr 2hr 2hr 全開 23hr	d1 d8 d1,8 d1 d1 d1 d1-2	1コース目 1コース目 2コース目以降
外科	16-24-039	アービタックス+FOLFIRI療法(biweekly)	14	規定なし	セツキシマブ セツキシマブ セツキシマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	400 mg /m2 250 mg /m2 250 mg /m2 150 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 1200 mg /m2	2hr 1hr 1hr 2hr 2hr 全開 23hr	d1 d8 d1,8 d1 d1 d1 d1-2	1コース目 1コース目 2コース目以降
外科	16-24-040	ベクティビックス+mFOLFOX6療法	14	規定なし	パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	6 mg /kg 85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 1200 mg /m2	1hr 2hr 2hr 全開 23hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	
外科	16-24-041	ベクティビックス+FOLFIRI療法	14	規定なし	パニツムマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	6 mg /kg 150 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 1200 mg /m2	1hr 2hr 2hr 全開 23hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	
外科	16-24-055	アービタックス+カンプト療法	14	規定なし	セツキシマブ イリノテカン	点滴静注 点滴静注	400 mg /m2 150 mg /m2	2hr 2hr	d1 d1	
外科	16-24-056	ベクティビックス+カンプト併用療法	14	規定なし	パニツムマブ イリノテカン	点滴静注 点滴静注	6 mg /kg 150 mg /m2	1hr 90min	d1 d1	
外科	16-24-059	IRIS療法	28	規定なし	イリノテカン S1	点滴静注 内服	125 mg /m2 120 mg /b	90min 分2	d1,15 d1(夕)-d15(朝)	80-120mg/b
外科	16-24-060	アバステン+IRIS療法	28	規定なし	ペバシズマブ イリノテカン S1	点滴静注 点滴静注 内服	5 mg /kg 100 mg /m2 120 mg /b	※ 90min 分2	d1,15 d1,15 d1(夕)-d15(朝)	※①90min②60min③30min 80-120mg/b
外科	16-24-063	FTD+TPI+Bev	28		ペバシズマブ トリフルリジン・チピラシル	点滴静注 内服	5 mg /kg 70 mg /m2	※ 分2	d1,15 d1-5,d8-12	※①90min②60min③30min
外科	16-24-064	FOLFIRI+RAM療法(点滴静注)	14	腫瘍の増悪または許容できない毒性の発現まで	ラムシルマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	8 mg /kg 150 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 1200 mg /m2	※ 2hr 2hr 全開 23hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	①60min②30min
外科	16-24-065	FOLFIRI+RAM療法(インフューザーポンプ)	14	腫瘍の増悪または許容できない毒性の発現まで	ラムシルマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	8 mg /kg 150 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 2400 mg /m2	※ 2hr 2hr 全開 46hr	d1 d1 d1 d1 d1	①60min②30min インフューザーポンプ
外科	16-24-066	mFOLFOX8(インフューザーポンプ)	14	規定なし	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 CV	85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 2400 mg /m2	2hr 2hr 全開 46hr	d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
外科	16-24-067	mFOLFOX8(インフューザーポンプ)+Bevacizumab	14	規定なし	ペバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	5 mg /kg 85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2	※ 2hr 2hr 全開	d1 d1 d1 d1	※①90min②60min③30min  インフューザーポンプ
外科	16-24-068	mFOLFOX8(インフューザーポンプ)+Panitumumab	14	規定なし	パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	6 mg /kg 85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2	1hr 2hr 2hr 全開	d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-24-069	mFOLFOX8(インフューザーポンプ)+Cetuximab(biweekly)	14	規定なし	セツキシマブ セツキシマブ セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	400 mg /m2 250 mg /m2 250 mg /m2 85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2	2hr 1hr 1hr 2hr 2hr 全開	d1 d8 d1,8 d1 d1 d1	1コース目 1コース目 2コース目以降  インフューザーポンプ
外科	16-24-070	FOLFIRI(インフューザーポンプ)	14	規定なし	イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注	150 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2	2hr 2hr 全開	d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-24-071	FOLFIRI(インフューザーポンプ)+Bevacizumab	14	規定なし	ペバシズマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	5 mg /kg 150 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2	※ 2hr 2hr 全開	d1 d1 d1 d1	※①90min②60min③30min  インフューザーポンプ
外科	16-24-072	FOLFIRI(インフューザーポンプ)+Panitumumab	14	規定なし	パニツムマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	6 mg /kg 150 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2	1hr 2hr 2hr 全開	d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-24-073	FOLFIRI(インフューザーポンプ)+Cetuximab(biweekly)	14	規定なし	セツキシマブ セツキシマブ イリノテカン セツキシマブ レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	400 mg /m2 250 mg /m2 150 mg /m2 250 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2	2hr 1hr 2hr 1hr 2hr 全開	d1 d8 d1 d1,8 d1 d1	1コース目 1コース目 2コース目以降  インフューザーポンプ
外科	16-24-075	FOLFIRI(インフューザーポンプ)+AFL	14	上限なし(病勢進行あるいは許容できない副作用が発現した場合は中止)	アフリベルセプト ベータ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	4 mg /kg 150 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2	1hr 90min 2hr 全開	d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-24-077	FOLFOXIRI(インフューザーポンプ)	14	12コース	イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	165 mg /m2 85 mg /m2 200 mg /m2 3200 mg /m2	1hr 2hr 2hr 48hr	d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-24-079	FOLFOXIRI(インフューザーポンプ)+Bevacizumab	14	12コース(13コース目以降は5FU+LV+Bevを維持としてPDまで使用可)	ペバシズマブ イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	5 mg /kg 165 mg /m2 85 mg /m2 200 mg /m2 3200 mg /m2	※ 1hr 2hr 2hr 48hr	d1 d1 d1 d1 d1	※①90min②60min③30min  インフューザーポンプ
外科	16-24-082	JACCRO FOLFOXIRI(インフューザーポンプ)	14	12コース	イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	150 mg /m2 85 mg /m2 200 mg /m2 2400 mg /m2	1hr 2hr 2hr 46hr	d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-24-084	JACCRO FOLFOXIRI(インフューザーポンプ)+Bevacizumab	14	12コース(13コース目以降は5FU+LV+Bevを維持としてPDまで使用可)	ペバシズマブ イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	5 mg /kg 150 mg /m2 85 mg /m2 200 mg /m2 2400 mg /m2	※ 1hr 2hr 2hr 46hr	d1 d1 d1 d1 d1	※①90min②60min③30min  インフューザーポンプ

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
外科	16-24-087	Pembrolizumab(q3w)	21	制限なし(PDまで)	ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
外科	16-24-088	Pembrolizumab(q6w)	42	制限なし(PDまで)	ペムブロリズマブ	点滴静注	400 mg /b	30min	d1	
外科	16-24-089	BINI+ENCO+Cmab(1コース目/q1w)	7	PDまで(2コース目以降のレジメンは別で申請あり)	セツキシマブ エンコラフェニブ ピニメチニブ	点滴静注 内服 内服	400 mg /m2 300 mg /b 90 mg /b	2hr 分1 分2	d1 連日 連日	
外科	16-24-090	BINI+ENCO+Cmab(2コース目以降/q1w)	7	PDまで	セツキシマブ エンコラフェニブ ピニメチニブ	点滴静注 内服 内服	250 mg /m2 300 mg /b 90 mg /b	1hr 分1 分2	d1 連日 連日	
外科	16-24-091	BINI+ENCO+Cmab(q2w)	14	PDまで	セツキシマブ エンコラフェニブ ピニメチニブ	点滴静注 内服 内服	500 mg /m2 300 mg /b 90 mg /b	2hr 分1 分2	d1 連日 連日	
外科	16-24-092	ENCO+Cmab(1コース目/q1w)	7	PDまで(2コース目以降のレジメンは別で申請あり)	セツキシマブ エンコラフェニブ	点滴静注 内服	400 mg /m2 300 mg /b	2hr 分1	d1 連日	
外科	16-24-093	ENCO+Cmab(2コース目以降/q1w)	7	PDまで	セツキシマブ エンコラフェニブ	点滴静注 内服	250 mg /m2 300 mg /b	1hr 分1	d1 連日	
外科	16-24-094	ENCO+Cmab(q2w)	14	PDまで	セツキシマブ エンコラフェニブ	点滴静注 内服	500 mg /m2 300 mg /b	2hr 分1	d1 連日	
外科	16-24-095	HP療法(1コース目/初回)	21	PDまで	ベルツズマブ トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注	840 mg /b 8 mg /kg	1hr 90min	d1 d1	
外科	16-24-096	HP療法(2コース目以降/維持)	21	PDまで	ベルツズマブ トラスツズマブ	点滴静注 点滴静注	420 mg /b 6 mg /kg	1hr 90min	d1 d1	
外科	16-24-097	FOLFIRI+Cmab(q2w)	14	規定なし	セツキシマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	500 mg /m2 150 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2	2hr 2hr 2hr 全開	d1 d1 d1 d1	
外科	16-24-098	FOLFIRI+Cmab(q2w)[インフューザーポンプ]	14	規定なし	セツキシマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	500 mg /m2 150 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 2400 mg /m2	2hr 2hr 2hr 全開 46hr	d1 d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-24-099	mFOLFOX6+Cmab(q2w)	14	規定なし	セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	500 mg /m2 85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 1200 mg /m2	2hr 2hr 2hr 全開 23hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	
外科	16-24-100	mFOLFOX6+Cmab(q2w)[インフューザーポンプ]	14	規定なし	セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	500 mg /m2 85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 2400 mg /m2	2hr 2hr 2hr 全開 46hr	d1 d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-24-101	Cetuximab(q2w)	14	PDまで	セツキシマブ	点滴静注	500 mg /m2	2hr	d1	