

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
脳神経外科	18-00-007	テモダール+インターフェロンβの併用療法	28	少なくとも6コース	インターフェロン ベータ テモゾロミド	点滴静注 内服	300万 IU /b 200 mg /m2	1hr 分1	d1,3,5 d1-5	150-200mg/m2
脳神経外科	18-00-008	MV療法	56	続けられるまで	ラニムスチン ピンクリスチン	点滴静注 点滴静注	100 mg /b 1 mg /b	1hr 1hr	d1 d1	
脳神経外科	18-00-009	PCV変法療法	42	3~6コース	ラニムスチン ピンクリスチン プロカルバジン	点滴静注 点滴静注 内服	100 mg /m2 1 mg /m2 100 mg /b	1hr 1hr	d1 d8,29 d8-21	
脳神経外科	18-00-011	アバステンとテモダール併用療法	28	少なくとも6コース	ペバシズマブ テモゾロミド テモゾロミド テモゾロミド	点滴静注 内服 内服 内服	10 mg /kg 75 mg /m2 150 mg /m2 200 mg /m2	※ 分1 分1 分1	d1,15,29 d1-42 d1-5 d1-5	2週間毎に投与。※①90min②60min③30min 放射線併用(初発の1コース目は42日TMZ投与、28日休業) 放射線併用なし(初発:2コース目以降、再発:1コース目) 放射線併用なし(初発:3コース目以降、再発:2コース目以降)
脳神経外科	18-00-012	テモダール点滴静注	28	少なくとも6コース	テモゾロミド テモゾロミド テモゾロミド	点滴静注 点滴静注 点滴静注	75 mg /m2 150 mg /m2 200 mg /m2	90min 90min 90min	d1-42 d1-5 d1-5	放射線併用(初発の1コース目は42日TMZ投与、28日休業) 放射線併用なし(初発:2コース目以降、再発:1コース目) 放射線併用なし(初発:3コース目以降、再発:2コース目以降)
脳神経外科	18-00-013	(点滴)テモダール・アバステン併用療法TMZ+Bev	28	少なくとも6コース	テモゾロミド テモゾロミド テモゾロミド ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	75 mg /m2 150 mg /m2 200 mg /m2 10 mg /kg	90min 90min 90min ※	d1-42 d1-5 d1-5 d1,15,29	放射線併用(初発の1コース目は42日TMZ投与、28日休業) 放射線併用なし(初発:2コース目以降、再発:1コース目) 放射線併用なし(初発:3コース目以降、再発:2コース目以降) ※①90min②60min③30min
脳神経外科	18-00-014	CARE療法(CBDCA+VP-16)	28	3コース	カルボプラチン エトボンド	点滴静注 点滴静注	450 mg /m2 100 mg /m2	1hr 1hr	d1 d1,2,3	